

Denna patientinformation har du
fått av din läkare/sjuksköterska.

PATIENTINFORMATION

Utrogestan[®]

(mikroniserat progesteron)

**för att förhindra för tidig
förlossning hos vissa kvinnor
vid enbarnsgraviditet.**

B **BESINS**
HEALTHCARE
By your side, for life

Utrogestan[®]
progesteron



Vad är Utrogestan®?

Utrogestan® innehåller det naturliga kvinnliga könshormonet progesteron, samma hormon som dina äggstockar producerar efter ägglossning.

Vilken funktion har Utrogestan®?

- Utrogestan® kan ges till vissa kvinnor med enbarnsgravitet för att förhindra för tidig förlossning.
- Progesteronet gör att livmodern är avslappnad och begränsar att livmodern får sammandragningar.
- Progesteronet hjälper till att hålla livmoderhalsen (livmodertappen) sluten genom att minska risken för att den blir mjuk och planar ut.



Så här använder du Utrogestan®

Observera! Utrogestan® innehåller sojalecitin. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja, ska du inte använda detta läkemedel.

- Utrogestan® är en mjuk vaginalkapsel som innehåller 200 mg progesteron.
- Behandling med Utrogestan® startar från cirka vecka 20 och avslutas den 34:e graviditetsveckan.
- Vaginalkapseln ska införas så djupt som möjligt i slidan – en gång dagligen vid läggdags.

Läggdags



Fullfölj behandlingen enligt din läkares anvisning.

Några tips vid behandling med Utrogestan®

- Vaginalkapseln införs bäst i rygggläge med lätt uppdragna ben.
- Inom 3–4 minuter löses kapseln upp i slidan och progesteronet har tagits upp i livmodern. Därefter kan övriga innehållsämnena som kapseln består av (bl.a. solrosolja) läcka ut och ge flytningar. Detta är helt normalt och du bör därför använda trosskydd varje natt under hela behandlingstiden.



● Vad ska jag göra om jag använt för stor mängd av Utrogestan®?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Vid överdosering kan du drabbas av yrsel eller trötthet.

● Vad ska jag göra om jag glömt att använda Utrogestan®?

Om du har glömt en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos ska du i stället hoppa över den glömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

● Läs bipacksedeln

Följ alltid de instruktioner läkaren har gett dig. Mer information finns i bipacksedeln. Läs noga igenom den.

● Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Utrogestan® orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar som kan förekomma är oljig flytning, blödning från slidan och klåda.

I mycket sällsynta fall (hos upp till 1 av 10 000 användare) kan en allvarlig allergisk reaktion, med andningssvårigheter eller yrsel, förekomma.

Egna anteckningar

Kontaktuppgifter

Utrogestan®

progesteron

Utrogestan® (mikroniserat progesteron) 200 mg eller 300 mg mjuk vaginalkapsel, vilken styrka som används beslutar den behandlande läkaren. Det är ett receptbelagt läkemedel.

Vad Utrogestan används för: Utrogestan kan användas i samband med provrörsbefruktning (IVF-behandling) för att hjälpa dig att bli gravid eller för att förhindra för tidig förlossning hos vissa kvinnor vid enbarnsgravitet.

Varningar och försiktighet

Utrogestan är inte ett preventivmedel.

Om du tror att du kan ha fått ett missfall ska du rådgöra med din läkare eftersom du måste sluta använda Utrogestan.

Om du får en vaginal blödning ska du tala med din läkare.

Om du tar detta läkemedel för att bidra till graviditet under fertilitetsbehandling ska Utrogestan endast användas under de tre första graviditetsmånaderna.

Om du tar detta läkemedel för att förhindra för tidig födsel vid ettbarnsgravitet ska din läkare diskutera riskerna och fördelarna med alternativen som är möjliga för dig. Du och din läkare ska ta ett gemensamt beslut kring vilken behandling som är mest lämpad.

Om det finns risk för att ditt barn föds för tidigt, kan du få Utrogestan mellan cirka 20:e till 34:e graviditetsveckan. Om ditt vatten går när du tar läkemedlet måste du uppsöka läkare så fort som möjligt. Om detta händer kan det finnas en omedelbar risk för dig och ditt barn.

I sällsynta fall, kan användning under andra och tredje trimestern av graviditeten medföra utveckling av leverproblem. Kontakta läkare om du får klåda, då detta kan vara symtom på leverproblem.

Läs bipacksedeln noga innan du startar din behandling med Utrogestan.

