

Den här broschyren har du fått av din  
läkare/sjuksköterska



## PATIENTINFORMATION

---

# Utrogestan®

(mikroniserat progesteron)

**för att minska risken för missfall  
hos kvinnor med blödning under  
pågående graviditet och som  
haft återkommande missfall**

## Vad är Utrogestan®?

Utrogestan® är en mjuk vaginalkapsel som innehåller 400 mg progesteron. Progesteron är det naturliga kvinnliga könshormonet som dina äggstockar producerar efter ägglossning.

### Vad används Utrogestan® för?

- Utrogestan® används för att underlätta graviditet genom att minska risken för missfall hos kvinnor med blödning under pågående graviditet och som haft återkommande missfall.
- Utrogestan® kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna broschyr. Fråga läkare, apoteks- eller annan sjukvårdspersonal om du har frågor kring behandlingen och följ alltid deras instruktioner.



## Så här använder du Utrogestan®

- Behandling med Utrogestan® för att minska risken för missfall ska sättas in vid första tecken på vaginalblödning under den första trimestern och ska fortsätta minst fram till den 16:e graviditetsveckan.
- Vaginalkapseln får inte sväljas utan ska föras så långt in i slidan som möjligt.
- Utrogestan® ska tas två gånger dagligen, en på morgonen och en vid sänggående.

400 mg	
Morgon	Kväll
x	x

Observera! Utrogestan® innehåller sojalecitin. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja, ska du inte använda detta läkemedel.

Fullfölj behandlingen enligt din läkares anvisning.

## Några tips vid behandling med Utrogestan®

- Vaginalkapseln införs bäst i ryggläge med lätt uppdragna ben.
- Inom 3–4 minuter löses kapseln upp i slidan och progesteronet har tagits upp i livmodern. Därefter kan övriga innehållsämnen som kapseln består av (bl.a. solrosolja) läcka ut och ge flytningar. Detta är helt normalt och du bör därför använda trosskydd under hela behandlingstiden.



## Vad ska jag göra om jag använt för stor mängd av Utrogestan®?

Om du fått i dig för stor mängd av Utrogestan® eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risk samt rådgivning. Vid överdosering kan du drabbas av yrsel eller trötthet.

## Vad ska jag göra om jag glömt att använda Utrogestan®?

Om du har glömt en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos ska du i stället hoppa över den glömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

## Läs bipacksedeln

Följ alltid de instruktioner läkaren har gett dig. Mer information finns i bipacksedeln. Läs noga igenom den.

## Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Utrogestan® orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Exempel på biverkningar som kan förekomma är flytningar, blödning från slidan och klåda.

### Egna anteckningar

---

---

---

### Kontaktuppgifter

---

---

**Utrogestan**<sup>®</sup> (mikroniserat progesteron) 400 mg består av en mjuk vaginalkapsel och är ett receptbelagt läkemedel.

**Vad Utrogestan används för:** Utrogestan kan användas för att underlätta graviditet genom att minska risken för missfall hos kvinnor med blödning under pågående graviditet och som haft återkommande missfall.

#### **Varningar och försiktighet**

Utrogestan ska endast användas under den första trimestern, fram till graviditetsvecka 16 och får endast administreras vaginalt. Tala med läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller barnmorska innan du använder Utrogestan.

Utrogestan är inte ett preventivmedel.

Om du tror att du har fått missfall ska du rådgöra med läkare eftersom behandlingen med Utrogestan i så fall måste avslutas.

Du måste kontakta din läkare om du får en blödning från slidan eller börjar må dåligt efter att du tagit medicinen ett par dagar.

**Läs bipacksedeln noga innan du startar din behandling med Utrogestan.**

