

حصلت على هذه النشرة من قبل طبيبك/ممرضتك.

معلومات المريضة

أوتروجيستان

(البروجسترون الميكروني)

Utrogestan®

لتقليل خطر الإجهاض التلقائي لدى النساء المصابات بنزيف
أثناء الحمل واللواتي تعرضن للإجهاض التلقائي المتكرر



ما هو الأوتروجيستان® Utrogestan؟

الأوتروجيستان® **Utrogestan** هو عبارة عن كبسولة مهبلية رخوة تحتوي على 400 ملجم من البروجيستيرون. البروجيستيرون هو الهرمون الجنسي الأنثوي الطبيعي الذي يفرزه المبيضان بعد الإباضة.

فيم يُستخدم الأوتروجيستان® Utrogestan؟

يُستخدم الأوتروجيستان® **Utrogestan** لتسهيل الحمل عن طريق تقليل خطر الإجهاض التلقائي لدى النساء اللاتي يعانين من نزيف أثناء الحمل واللاتي تعرضن للإجهاض المتكرر.

قد يتم التصريح باستخدام الأوتروجيستان® **Utrogestan** أيضًا لعلاج حالات أخرى غير المذكورة في هذه النشرة. اسأل طبيبك أو الصيدلي أو أي أخصائي رعاية صحية آخر إذا كانت لديك أي أسئلة حول علاجك واتبعي دائماً تعليماتهم.

كيفية استخدام الأوتروجيستان® Utrogestan

يجب أن يبدأ العلاج بالأوتروجيستان® لتقليل خطر الإجهاض التلقائي عند ظهور أول علامة على حدوث نزيف مهبلية في الثلث الأول من الحمل ويجب أن يستمر على الأقل حتى الأسبوع السادس عشر من الحمل.

لا يجوز ابتلاع الكبسولة المهبلية بل يجب إدخالها في المهبل قدر الإمكان.

يجب وضع الأوتروجيستان® **Utrogestan** في المهبل مرتين يومياً، مرة في الصباح ومرة عند النوم.

400 ملجم

المساء	الصباح
X	X

لاحظي من فضلك! يحتوي الأوتروجيستان® **Utrogestan** على ليسينين الصويا. إذا كنت تعانين من حساسية من الفول السوداني أو فول الصويا، فلا يجوز أن تستخدمي هذا الدواء.

أكملي العلاج طبقاً لتعليمات الطبيب.

بعض النصائح عند استخدام الأوتروجيستان® Utrogestan

يُفضل إدخال الكبسولة المهبلية في وضع الاستلقاء على الظهر مع رفع الساقين قليلاً.

في غضون 3-4 دقائق تذوب الكبسولة في المهبل ويدخل هرمون البروجيستيرون داخل الرحم. بعد ذلك قد تتسرب المكونات الأخرى التي تتكون منها الكبسولة (بما في ذلك زيت عباد الشمس) مسببة إفرازات مهبلية. وهذا أمر طبيعي تماماً ولذلك يجب عليك ارتداء فوط صحية يومية طيلة فترة العلاج.



ماذا ينبغي عليّ أن أفعل إذا استعملت كمية كبيرة من الأوتروجيستان ?Utrogestan®

إذا أخذت كمية كبيرة من الأوتروجيستان® **Utrogestan** أو أخذ طفل ما الدواء عن غير قصد على سبيل المثال، اتصلي بالطبيب أو المستشفى أو مركز معلومات السموم (هاتف 112) لتقييم المخاطر والحصول على المشورة. إذا أخذت جرعة زائدة، فقد تصابين بدوار أو تعب.

ماذا ينبغي عليّ أن أفعل إذا نسيت استخدام الأوتروجيستان® **Utrogestan**؟

إذا نسيت أخذ إحدى الجرعات عليك أخذها حالما تتذكرينها. في حال كان وقت الجرعة التالية على وشك أن يحين فعليك تخطي الجرعة المنسية. لا تأخذي جرعة مضاعفة لتعويض جرعة منسية.

اقرأ النشرة المرفقة

اتبعي دائماً التعليمات التي يزودك بها طبيبك. لمزيد من المعلومات راجعي النشرة المرفقة. واقرئيها بإمعان.

الأعراض الجانبية المحتملة

يمكن أن يسبب الأوتروجيستان® **Utrogestan**:

آثاراً جانبية كما هو حال جميع الأدوية، ولكن ليس من الضروري أن تصيب هذه الأعراض جميع المستخدمين. وتتضمن الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث الإفراز المهبلي والنزيف من المهبل والحكة.

الملاحظات الخاصة

معلومات الاتصال

Utrogestan är avsett för prevention av missfall hos kvinnor med blödning under första trimestern av graviditeten och som haft återkommande missfall.

