

إن معلومات الاستخدام هذه مقدمة  
من قبل الطبيب/ الممرض المختص.

## معلومات المريضة

**Utrogestan®** الأوتروجستان  
(بروجسترون ميكروني) بالتزامن  
مع الإخصاب في المختبر (علاج  
أطفال الأنابيب)




## ما هو الأوتروجيستان® Utrogestan؟

يحتوي الأوتروجيستان® Utrogestan على هرمون البروجيستيرون الجنسي الأنثوي الطبيعي، وهو نفس الهرمون الذي ينتجه المبيضان بعد التبويض.

## ما هي وظيفة أوتروجيستان® Utrogestan؟

يتم إعطاء الأوتروجيستان® Utrogestan للنساء اللواتي يحتجن مزيداً من هرمون البروجيستيرون خلال فترة خضوعهن لعمليات التلقيح الاصطناعي (الإخصاب بالمساعدة). ويعد هرمون البروجيستيرون ضرورياً لتجهيز بطانة الرحم لاستقبال البويضة المخصبة، وهو ما يعد شرطاً أساسياً للحمل. بعد استخراج البويضات، لا يكون إنتاج البروجيستيرون دائماً كافياً لزرع الجنين في بطانة الرحم، لذلك يجب تزويد جسمك بالبروجيستيرون.



## بعض النصائح عند استخدام أوتروجيستان® Utrogestan

يُفضل إدخال الكبسولة المهبلية في وضع الاستلقاء مع رفع الساقين قليلاً.

في غضون **3-4** دقائق تذوب الكبسولة في المهبل ويدخل هرمون البروجسترون داخل الرحم. بعد ذلك، قد تتسرب المكونات الأخرى التي تتكون منها الكبسولة المهبلية (مما في ذلك زيت عباد الشمس) مسببة إفرازات مهبلية. وهذا أمر طبيعي تمامًا ولذلك يجب عليك ارتداء فوط صحية يومية طيلة فترة العلاج.



## كيفية استخدام الأوتروجيستان® Utrogestan

لاحظي من فضلك! يحتوي الأوتروجيستان® Utrogestan على ليسيثين الصويا. إذا كنت تعانين من حساسية من الفول السوداني أو فول الصويا، فلا يجوز أن تستخدمِي هذا الدواء.

الأوتروجيستان هو عبارة عن كبسولة مهبلية رخوة متوفرة بتركيزين: **200** ملجم و **300** ملجم من البروجسترون.

يبدأ العلاج باستخدام الكبسولة المهبلية في موعد لا يتجاوز اليوم الثالث بعد نقل الجنين.

يجب إدخال الكبسولة المهبلية يوميًا داخل المهبل بأقصى عمق ممكن. يعتمد عدد المرات التي يجب أن تُعالَجِي فيها يوميًا على التركيز الذي تُعالَجين به أو تعليمات طبيبك. انظري جداول الجرعات أدناه

200 ملجم		
مساءً	وقت الغداء	صباحًا
×	×	×

300 ملجم	
مساءً	صباحًا
×	×

أكملي العلاج وفقًا لتعليمات طبيبك.

## الآثار الجانبية المحتملة

يمكن أن يسبب الأوتروجيستان® **Utrogestan** آثارًا جانبية كما هو حال جميع الأدوية، ولكن ليس من الضروري أن تصيب هذه الأعراض جميع المستخدمين. وتتضمن الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث الإفراز الدهني والنزيف من المهبل والحكة.

في حالات نادرة جدًا (تصل إلى 1 من كل 10,000 مستخدمة) قد يحدث رد فعل تحسسي شديد، مع صعوبة في التنفس أو الدوار.

## الملاحظات الخاصة

---

---

---

## معلومات الاتصال

---

---

## ماذا ينبغي عليّ أن أفعل إذا نسيت استخدام الأوتروجيستان® **Utrogestan**؟

إذا نسيت أخذ إحدى الجرعات عليك أخذها حاملًا تتذكرينها. في حال حان وقت الجرعة التالية فعليك تخطي الجرعة المنسية. لا تأخذي جرعة مضاعفة لتعويض جرعة منسية.

## اقرأ النشرة المرفقة

اتبعي التعليمات التي يزودك بها طبيبك على الدوام. لمزيد من المعلومات راجعي النشرة المرفقة. واقرئيها بعناية.

# Utrogestan®

progesteron

2024-03 SE-UTR-147 MAR 2023

**Utrogestan®** (mikroniserat progesteron) 200 mg eller 300 mg mjuk vaginal-kapsel, vilken styrka som används beslutar den behandlande läkaren. Det är ett receptbelagt läkemedel.

**Vad Utrogestan används för:** Utrogestan kan användas i samband med provrörsbefruktning (IVF-behandling) för att hjälpa dig att bli gravid eller för att förhindra för tidig förlösning hos vissa kvinnor vid enbarnsgravitet.

### Varningar och försiktighet

Utrogestan är inte ett preventivmedel.

Om du tror att du kan ha fått ett missfall ska du rådgöra med din läkare eftersom du måste sluta använda Utrogestan.

Om du får en vaginal blödning ska du tala med din läkare.

Om du tar detta läkemedel för att bidra till graviditet under fertilitetsbehandling ska Utrogestan endast användas under de tre första graviditetsmånaderna.

Om du tar detta läkemedel för att förhindra för tidig födsel vid ettbarnsgravitet ska din läkare diskutera riskerna och fördelarna med alternativen som är möjliga för dig. Du och din läkare ska ta ett gemensamt beslut kring vilken behandling som är mest lämpad.

Om det finns risk för att ditt barn föds för tidigt, kan du få Utrogestan mellan cirka 20:e till 34:e graviditetsveckan. Om ditt vatten går när du tar läkemedlet måste du uppsöka läkare så fort som möjligt. Om detta händer kan det finnas en omedelbar risk för dig och ditt barn.

I sällsynta fall, kan användning under andra och tredje trimestern av graviditeten medföra utveckling av leverproblem. Kontakta läkare om du får klåda, då detta kan vara symtom på leverproblem.

**Läs bipacksedeln noga innan du startar din behandling med Utrogestan®**

